

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ

Главный внештатный специалист
паллиативной медицинской помощи
министерства здравоохранения Иркутской
области А.П. Бессонов

- ▶ Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации.»
- ▶ Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.04.2015г. №187н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению.»

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

- ▶ Улучшение качества жизни неизлечимо больных граждан.
- ▶ Представляет комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания.
- ▶ Ст.36.

ЦЕЛЬ

▶ **Амбулаторный этап:**

- ▶ Кабинет паллиативной медицинской помощи;
- ▶ Выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи.


▶ **Стационарный этап:**

- ▶ Отделение паллиативной медицинской помощи;
- ▶ Хоспис;
- ▶ Отделение сестринского ухода;
- ▶ Дома сестринского ухода.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

- ▶ В поликлинике
- ▶ На дому

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ



- ▶ 1. Осмотр места нахождения пациента:
 - ▶ - кровать;
 - ▶ - предметы ухода;
 - ▶ - средства ухода;
- ▶ 2. Жалобы больного;
- ▶ 3. Осмотр пациента;
- ▶ 4. Назначение лечения;
- ▶ 5. Рекомендации и обучение ухаживающих методам ухода за пациентом.

НА ДОМУ

- ▶ Злокачественные новообразования;
- ▶ Тяжелые необратимые последствия мозгового кровообращения;
- ▶ Тяжелые необратимые последствия травм;
- ▶ Дегенеративные заболевания нервной системы;
- ▶ Прогрессирующие заболевания терапевтического профиля в терминальной стадии;
- ▶ Органная недостаточность в стадии декомпенсации.

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ

- ▶ **Боль:** основная причина обращения за медицинской помощью у онкологических больных в терминальной стадии
- ▶ **Пролежни, застойные пневмонии и когнитивные нарушения:** основные причины обращения при других заболеваниях.

ТЯГОСТНЫЕ СИМПТОМЫ

Боль слабой
интенсивности
0 – 40 %

1. Парацетамол
2. НПВП
3. Анальгин

Боль умеренной
интенсивности
40 – 70 %

1. Трамадол до 400 мг/сут
2. Просидол 20-60 мг/сут
3. Морфина сульфат 10-30 мг/сут
4. ТТС фентанила 12,5 мкг/ч
5. ТТС бупренорфин 35 мкг/ч

Боль сильной
интенсивности
70 – 100 %

1. Морфина сульфат от 30 мг/сут
2. Просидол от 60 мг/сут
3. ТТС фентанила от 25 мкг/ч
4. ТТС бупренорфин от 52,5 мкг/ч
5. Таргин (оксикодон+налоксон)

При порыве боли

Инъекции:
Морфина;
Промедола.

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

The image features a blue gradient background. In the center, the text "СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!" is written in a yellow, italicized, sans-serif font. In the bottom right corner, there are several white, parallel diagonal lines of varying lengths, creating a sense of motion or a modern design element.